

AVIVALG[®]500

AVIVALG500[®] est formulée à partir d'une base organique unique, composé d'un extrait colloïdal d'algues marines (*Ascophyllum Nodosum*) issu d'ULTRALG[®].

L'Extrait d'algues brunes est riche en oligo-éléments, vitamines, polysaccharides et oligosaccharides, acides aminés et phytohormones (Cytokinines, gibbérellines, auxines...). De composition proche des cellules végétales de la feuille.

L'algue utilisée est récoltée dans les eaux froides de Norvège et après une hydrolyse alcaline, devient un extrait d'algue solide hautement assimilable, l'ULTRALG[®]. C'est l'adaptation de procédés industriels issus du domaine pharmaceutique, qui permet l'obtention d'un concentré liquide qualitatif, l'AVIVALG500[®].

Un broyage liquide est appliqué à l'ULTRALG[®], permettant de microniser la poudre d'algue et ainsi d'augmenter la surface de contact et d'échange. En plus d'une parfaite homogénéité de la formulation, cela va favoriser la solubilité de l'extrait d'algue et augmenter les échanges et l'assimilation par les végétaux.

AVIVALG500[®] est un phyto-stimulant et un phyto-energisant qui a des effets multiples sur la physiologie des plantes. Il apporte des compléments nutritifs et phytohormones dont elles ont besoin pour leurs défenses naturelles et équilibres nutritionnels, des facteurs importants pour leur développement.

Préconisation d'emploi :

Compatible avec la plupart des spécialités phytopharmaceutiques, l'effet adjuvant des algues améliore leur suspension.



Viticulture

- En foliaire : 8 à 10 applications à 1 L/ha dès l'apparition des organes verts jusqu'à la nouaison.
- Au sol : 10 L/ha au coutre ou au pal injecteur en un seul passage avec les chélates.

Arboriculture

- En foliaire : 1 L/ha tous les 12 à 14 jours au début et pendant le stade végétatif.
- Au sol : 10 L/ha au début du printemps.

Maraîchage

- En foliaire : 1 L/ha tous les 12 à 14 jours au début et pendant le stade végétatif.
- Au sol : 10 L/ha au début du printemps.

En cas de fortes déficiences, le nombre d'applications peut être augmenté.

Ne pas dépasser les doses prescrites. Effectuer un test préalable en cas d'utilisation en mélange avec d'autres produits. Pulvériser par temps calme sur plante turgescence, éviter les heures chaudes. Stocker hors gel et à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine fermé. Toute utilisation du produit différente de la préconisation ci-dessus constitue une adaptation aux conditions particulières pour laquelle NOVALE ne saurait être tenue pour responsable.

Bidons de 10 L, palettes de 60 unités.

- Tenir à l'abri du gel
- Agiter avant emploi

AVIVALG 500 Composition

Extrait d'algue ULTRALG [®]	500 g/L
Azote total (N) organique	7,5 g/L
K ₂ O	100 g/L

